



Når vil Drammensområde være fritt for *G. salaris*?





Vassdrag med påvist smitte av *Gyrodactylus salaris*

Totalt 51 vassdrag fordelt på 17 regioner




Bekjempelse av *G. salaris*

Status mars, 2021

● Behandlet og friskmeldt (39)

● Behandlet, men fortsatt ikke friskmeldt (4)

● Infiserte vassdrag (8)



Regioner ferdigbehandlet til friskmelding



Koordineringsgruppa og referansegruppe (lokal forankring)



Friskmeldingsprogrammet



Reetablering



Oppheve tiltakssonen og søke fristatus ESA



Vassdragsregulantens pålegg



MILJØ-
DIREKTORATET

Metoder for bekjempelse



Rotenonbehandling

- effektivt, nye behandlingsmetoder som er internasjonalt publisert tatt i bruk
- lang erfaring
- tar livet av all fisk
- krever betydelig bevaringsarbeid



Surt aluminium

- Utviklet over en 10-årsperiode (2000-2010)
- Benyttet metode i Lærdalselva 2011-2012
- Svært krevende metodikk
- Fisken overlever



Klormetoden

- Metode under utvikling (5 år)
- Stort potensiale
- Fisken overlever


Bekjempelse av *G. salaris*

Status mars, 2021

● Behandlet og friskmeldt (39)

● Behandlet, men fortsatt ikke friskmeldt (4)

● Infiserte vassdrag (8)



Driva-regionen



Bathnfjordselva

Usma

Sunndalsøra

Fiskesperre

Fiskesperre

Litledalselva


Oppdal

Driva





Tidslinje for bekjempelse av *G. salaris* i Driva



Drammen-regionen








Prioriterte oppgaver

-  Gjennomføre nødvendige utredninger i henhold til de utfordringene ekspertgruppa har identifisert.
-  Videreføre kartleggingsarbeidet for å identifiserte eventuelle problemer knyttet til selve behandlingen.
-  Følge opp stenging av Hellefossen.
-  Følge opp vassdragsregulantene.
-  Foreta en vurdering av bevaringsbehovet ved ulike scenarier.
-  Bevaringsarbeid jfr Driva
-  Organisering/Lokal forankring.
-  Vurdere klormetoden i regionen.



Tentativ tidslinje for bekjempelse av *G. salaris* i Drammen-regionen



Risiko-soner

- Svenske vestkysten
- Tornälven
- Tuloma (Kola)






1

Infiserte
Gyrodactylus-
elver mellom
Gøteborg og
Helsingborg

2

Bullaren
↓
Enningdals-
elva

High Risk Areas for Occurrence and Transmission
of *Gyrodactylus salaris* in the Northern Regions of
Norway, Sweden and Finland



Reisaelva

Skibotn-regionen

Torneälven

